

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr 61/12.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:

RAPAN, FAINARE, MONILIOZA, PATAREA CARAMIZIE, A FRUNZELOR, VIRUSURI LATENTE + PADUCHELE
LANOS, PADUCHELE DIN SAN JOSE (G1) VIERMELE MERELOR (G2), ACARIENI
INSECTE MINATOARE, ALTI DAUNATORI

-Care pot cauza pierderi importante la culturile: MAR (PAR, GUTUI)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 10,11

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

Rapan-frunze grad de atac peste 10%; fainare-frunze grad de atac peste 10%; San Jose-prezența daunatorului (larve) în livada, pomi cu atac peste 3%; viermele merelor-prezența daunatorului; acarieni-3-5 forme mobile pe frunza.

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. SHAVIT 72 WDG-2,0 kg/ha + PYRINEX QUIK- 1,5 litri/ha (în 1500 litri apa/ha) sau

2. BRAVO 500SC-2,5 litri/ha + SULPHUR 80WG-4,5kg/ha + CALYPSO 480 SC-0,3 litri/ha (în 1500 litri apa/ha)

3. VONDOZEB-2,0kg/ha + SCORE 250EC-0,2 litri/ha + MOSPILAN 20SG-0,350-0,450kg/ha (în 1500 litri apa/ha)

4. ORIUS 25EW-0,75l/ha + NOVADIM PROGRESS—1,125-1,5 l/ha (în 1500 litri apa/ha) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: 12-16.07.2019

Alte recomandări:

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fără precipitații și se va repeta după 10 zile. Nu se vor efectua două tratamente succesive cu același tip de produs. Se vor respecta recomandările cuprinse pe eticheta produsului. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se va respecta timpul de pauza de la tratament până la consum pentru soiurile de vară.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)


Luată măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr. 62/12.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

PATAREA ROSIE A FRUNZELOR DE PRUN, MONILIOZA, CIURUIREA MICOTICA + VIERMELE PRUNELOR (G2) PADUCHELE DIN SAN JOSE (G1), PADUCHELE CENUSIU, AFIDE, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 10,11

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

Patarea rosie-frunze cu grad de atac peste 10%, ciuruire-frunze cu grad de atac peste 5%; monilioza- peste 3% fructe cu atac; San Jose prezenta daunătorului (larve) în livadă, pomi cu atac peste 3%.
Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. ORIUS 25EW-0,1% + KARATE ZEON-0,015 % sau
2. CAPTAN 80WDG-0,15% + MOSPILAN 20SG-0,03% sau
3. MERPAN 50WP-0,25% + NOVADIM PROGRESS-0,1% sau
4. FOLPAN 80WDG + CALYPSO 480SC-0,02% sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: 12-16.07.2019

Alte recomandari:

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fara precipitații și se va repeta după 10 zile. Nu se vor efectua doua tratamente succesive cu același tip de produs. Se vor respecta recomandările cuprinse pe eticheta produsului. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. Se va respecta timpul de pauza de la tratament până la consum (pentru soiurile timpurii de vara)

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazine și se elimina prin programul SCAPA.

ATENȚIE! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR". ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr 63/12.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

**ANTRACNOZA FRUNZELOR DE CIRES, CIURUIREA FRUNZELOR, MONILIOZA + PADUCHELE
CENUSIU, INSECTE MINATOARE, ACARIENI, AFIDE, ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: CIRES-VISIN

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 6,7

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:

Antracnoza -frunze cu grad de atac peste 10%, ciuruire-frunze cu grad de atac peste 5% (afide-15%) frunze cu atac.

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. ALCUPRAL 50PU-2,0kg/ha+CALYPSO 480 SC-2,0 litri/ha sau
2. MERPAN 80WDG-2,0kg/ha+NOVADIM PROGRESS-0,750 litri/ha sau
3. CUPROXAT FLOWABLE-3,5 litri/ha+KARATE ZEON-0,150 litri/ha sau
4. TOPSIN 70WDG-0,7kg/ha+FASTAC 10EC-0,150 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optima de tratament: imediat dupa recoltare
Alte recomandari:*

*Tratamentul se va efectua pe timp finistit fara precipitatii si se va repeta dupa 10 zile.
Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. In plantatiile pe rod se
considera tratament cheie, de baza (pentru antracnoza)*

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A
PLANTELOR**

*Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa
golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de
trat.*

Ambalajele se depoziteaza in magazine si se elimina prin programul SCAPA.

**ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A
PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A
PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

*Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in **cadrul schemelor
si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 10)***

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de
securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului;
precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A., privind implementarea
legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE
TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr. 64/12.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

MANA TOMATELOR, ALTERNARIOZA+ MOLIA MINIERA A TOMATELOR (Tuta absoluta), MUSCULITA ALBA DE SERA AFIDE, ALTI DAUNATORI
Care pot cauza pierderi importante la culturile:

TOMATE (VINETE) (cultura a II-a spstii protejate)
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului: 1,2
Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:

Mana-fr. GA10: alternarioza-fr. GA10: musculita alba de sera -fr. GA peste 15%: afide -fr. GA peste 15%.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

- 1. CABRIO TOP-1,5-2,0 kg/ha+CORAGEN-175ml/ha sau**
 - 2. RIDOMIL GOLD MZ 68WG 2,5kg/ha+ALVERDE- 1,0 litri/ha sau**
 - 3. ARMETIL COBRE-2,5kg/ha+TOPSIN 500SC 0,7 litri/ha +BACTOSPEINE DF-0,33-0,66kg/ha sau**
- ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: cand se realizeaza conditiile de mai sus.

Alte recomandari:

Monitorizarea culturii de tomate si vinete prin instalarea capeanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza în magazine și se elimina prin programul SCAPA.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR". ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.nadr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în **Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.**

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in **cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)**

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A., privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Tina Huciu Anasta